

診療科	レジメン名	癌腫	抗がん剤	用量	単位	投与法	投与日	コース
全科	ペムブロリズマブ療法 (MSI-High, TMB-Highを有する固形癌) (200mg 21日)	MSI-High, TMB-Highを有する固形癌	キイトルーダ	200	mg	点滴	day1	21日間
	ペムブロリズマブ療法 (MSI-High, TMB-Highを有する固形癌) (400mg 42日)	MSI-High, TMB-Highを有する固形癌	キイトルーダ	400	mg	点滴	day1	42日間
	ニホルマブ療法 (240mg 14日)	原発不明癌	オブジーボ	240	mg	点滴	day1	14日間
	ニホルマブ療法 (480mg 28日)	原発不明癌	オブジーボ	480	mg	点滴	day1	28日間
	カルボプラチン・パクリタキセル療法	原発不明癌	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴	day1	21日間
			カルボプラチン	AUC=5		点滴	day1	
	アドリアシン療法 (軟部肉腫)	肉腫	アドリアシン	75	mg/m ²	点滴	day1	21日間
ハラヴェン療法 (肉腫)	肉腫	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴	day1.8	21日間	